

Blokada przykręgową (PVB, paravertebral blockade)

To podanie leków o działaniu znieczulającym, przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym oraz regenerującym otoczkę mielinową włókien nerwowych w okolicę ujścia nerwów wychodzących przez otwory międzykręgowy kręgosłupa celem jednostronnego wyłączenia transmisji impulsacji bólowej.

Blokada przykręgową ponad 100 lat jest stosowana jako metoda likwidacji bólu oraz poprawiająca metabolizm nerwów obwodowych.

Technika wykonania.

W miejscu najsilniejszego bólu przez igłę iniekcyjną do przestrzeni przykręgową, która zawiera gałąź grzbietową i brzuszную nerwu rdzeniowego (nerw międzyżebrowy), gałązki łączące (białe i szare) oraz pień współczulny podajemy leki tradycyjnie stosowane: lignocaina, dexaven, witamina B12.

Wybór leków zależy od chorób współistniejących.

Wskazania

Lumbago (postrzał) - przeszywający ból w okolicy odcinka lędźwiowo-krzyżowego (L-S) kręgosłupa

Rwa kulszowa z ostrym zespołem bólowym - ból spowodowany drażnieniem korzeni nerwu kulszowego w odcinku L-S z promieniowaniem do kończyny dolnej

Przeciwwskazania

Zakażenie skóry

Proces rozrostowy rdzenia kręgowego

Nowotwór i przerzuty do kręgosłupa

Ropne i wirusowe zapalenie rdzenia

Urazy kręgosłupa

Cukrzyca

Zaburzenia krzepliwości krwi

Nieleczone nadciśnienie tętnicze

Uczulenie na tradycyjnie stosowane leki